3me CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES MALACODERMES NEOTROPIQUES

par

W. WITTMER, Buenos Aires

MALACHIIDAE

Attalus denieri nov. spec.

Jaune-rougeâtre, tête noire, dessus du premier article et derniers articles des antennes rarement foncés, prothorax entièrement rougeâtre (où orné avec une petite macule discale noire ab. *ornatus* nov.); élytres jaunes, la suture et souvent aussi la côte latérale, rouges, chacun orné de deux taches noires, l'une un peu plus petite, presque ronde, sur l'épaule et touchant la base à cet endroit, l'autre un peu plus grande, ovalaire, isolée, sur la partie postérieure. Tarses parfois légèrement rembrunis. Ventre entièrement jaune à l'exception du dernier sternum qui est largement bordé de noir, le dernier tergum est complètement noir.

Tête avec les yeux un peu plus étroite que le prothorax, peu convexe, lisse. Antennes assez courtes, dépassant légèrement la base du prothorax, tous les articles un peu plus longs que larges, le 4e paraissant le plus long de tous. Prothorax transverse, tous les angles arrondis, complètement lisse. Elytres assez élargis vers leur sommet qui est largement arrondi, ponctuation assez forte, plus espacée sur la partie postérieure que devant, côte latérale saillante, pubescence assez dense, très courte, noir, dressée. Dernier segment ventral du ♂ profondément échancré.

Long: 3 mm. Hab.: Argentine, Resistencia 11, 1935; Clorinda (Formosa) 16-10-1937, leg. Pierre Denier. Type et cotypes dans ma collection, cotype dans la collection du Museum de La Plata.

Cette espèce rentre dans le groupe qui a les élytres marqués de quatre macules noires, munis d'une côte humérale assez saillante.

Elle diffère de *quadrisignatus* Pic et *bogotanus* Pic principalement par la tête entièrement foncée.

Je dédie cette jolie espèce à notre regretté collègue Mr. Pierre Denier.

CANTHARIDAE

Oontelus biparticularus nov. spec.

♂ Tête noire, testacée à partir de l'insertion des antennes; prothorax testacé avec le rebord antérieur noir; élytres noirâtres avec une bande latérale jaune, assez étroite, commençant aux épaules et s'étendant presque vers les extremités où elle est bien moins nette qu'au début; antennes foncées avec les 4 ou 5 premiers articles testacés, pattes claires, cuisses et tarses un peu rembrunis.

Tête avec les yeux moins larges que le prothorax, lisse, finement pubescente. Antennes un peu plus longues que la moitié du corps, 3e et 4e article particuliers, le 3e est très allongé et élargi au somment, de la longueur du 1er, au sommet à peu près deux fois plus large que la base; le 4e est assez petit, noduleux, dans sa forme très semblable au 2e, il est couvert en partie par l'élargissement du 3e, (vu d'en haut); 5e un peu plus long que le 4e, mais visiblement moins long que le 6e; 6e et suivants allongés, cylindriques, chacun à peu près 2 fois ¼ plus longs que larges. Prothorax large et court, environ 2 fois plus large que long, fortement rebordé antérieurement, à côtés presque droits, retrécis à la base, les angles antérieurs sont légèrement proéminents, cette proéminence est formée par le rebord antérieur qui dépasse un peu les côtés; angles antérieurs nuls, postérieurs obtus, disque complètement lisse, l'impression longitudinale médiane est courte; restreinte sur la partie postérieure. Elytres très allongés, parallèles, environ trois fois plus longs que larges, côte humérale peu saillante, ponctuation réticulée disposée en rangés réguliers.

Long.: 3 mm. Hab.: Argentine, Loreto (Misiones) IX, 1935.

La coloration élytrale rapelle à *O. bilineatus* Pic, mais la forme antennaire est toute autre, *O. biparticularus* n'ayant que les articles 3 et 4 particuliers, tandis que *bilineatus* Pic à les 6 premiers articles épaissis (selon description).

Je dois cette nouveauté à mon ami Mr. Juan M. Bosq, qui a bien voulu me laisser le type.

Oontelus pallidicollis nov. spec.

♀ Noir, prothorax, pattes et deux premiers articles des antennes flaves.

Tête petite, bien moins large que le prothorax, lisse. Antennes peu allongées, tous les articles plus longs que larges, 3e deux fois plus long que le 2e; 4e un peu moins long que le 3e, les suivants de la même longueur que le 4e. Prothorax au moins deux fois plus large que long, fortement rebordé antérieurement, rebords latéraux moins élevés que l'antérieur, côtés légèrement courbés, peu rétrécis à la base, disque lisse, l'impression longitudinale médiane est assez bien marquée. Elytres allongés, parallèles, environ trois fois plus longs que larges, côte humérale presque effacée, ponctuation réticulée disposée en rangés réguliers, points très gros, leur diamètre plus grand que l'espace qui les sépare.

Long.: 3,7 mm. Hab.: Brésil: Nova Teutonia (Sta. Cantharina) 10-1939 (leg. Fritz Plaumann), type dans ma collection.

Espèce facile à reconnaître par son prothorax entièrement testacé et la tête complètement noire.